

La définition précise des critères (indicateurs)


Indicateurs de suivi déclaratifs

Pour répondre aux critères de la Convention médicale de juillet 2011, le logiciel DrSanté se dote d'un module de gestion des indicateurs de Paiement à la Performance.

Concernant les médecins traitants, cinq indicateurs doivent être déclarés sur Espace pro ou, pour les médecins non informatisés, sur formulaire papier.

Ces formulaires sont disponibles auprès de votre caisse et sont à renvoyer à celle-ci avec votre signature et votre cachet par e-mail à l'une des adresses suivantes :
 rosp@cpam-xxx ou rosp@cgssxxx.

En amont, vous saisissez dans les dossiers différentes mesures (volet médical du dossier > Mesures) :



Mesures			
Taille	PAS	LDL	HDL
Poids	PAD	HbA1c	Diabète
IMC	FC	Créatininémie	Ins. hépatique
Sur. corporelle	Hypertension	Clairance	

En aval, au niveau des statistiques, les indicateurs de suivi sont définis par un ou plusieurs critères pour un ensemble de patients définis (un même patient peut être recensé dans plusieurs indicateurs) :

Indicateurs	Numérateur	Dénominateur
Résultat du dosage HbA1c < 8,5%	Nombre de patients diabétiques de type II vous ayant déclaré comme médecin traitant et vous ayant consulté au moins une fois dans l'année, dont le dernier dosage d'HbA1C est < 8,5%.	Nombre de patients diabétiques de type II vous ayant déclaré comme médecin traitant et vous ayant consulté au moins une fois dans l'année, qu'il ait bénéficié d'un dosage ou non dans l'année.

Résultat du dosage HbA1c < 7,5%	Nombre de patients diabétiques de type II vous ayant déclaré comme médecin traitant et vous ayant consulté au moins une fois dans l'année, dont le dernier dosage d'HbA1C est < 7,5%.	Nombre de patients diabétiques de type II vous ayant déclaré comme médecin traitant et vous ayant consulté au moins une fois dans l'année, qu'il ait bénéficié d'un dosage ou non dans l'année.
Résultat du LDL cholestérol < 1,5 g/l	Nombre de patients diabétiques de type II vous ayant déclaré comme médecin traitant et vous ayant consulté au moins une fois dans l'année, et dont le dernier dosage de LDL cholestérol est < 1,5 g/l	Nombre de patients diabétiques de type II vous ayant déclaré comme médecin traitant et vous ayant consulté au moins une fois dans l'année, qu'il ait bénéficié d'un dosage ou non dans l'année.
Résultat du LDL cholestérol < 1,3 g/l	Nombre de patients diabétiques de type II vous ayant déclaré comme médecin traitant et vous ayant consulté au moins une fois dans l'année, et dont le dernier dosage de LDL cholestérol est < 1,3 g/l	Nombre de patients diabétiques de type II vous ayant déclaré comme médecin traitant et vous ayant consulté au moins une fois dans l'année, qu'il ait bénéficié d'un dosage ou non dans l'année.
Hypertension artérielle	Nombre de patients hypertendus vous ayant déclarés médecin traitant et vous ayant consulté au moins une fois dans l'année, dont les derniers chiffres de pression artérielle sont ≤140/90 mmHg	Nombre de patients hypertendus vous ayant déclarés médecin traitant et vous ayant consulté au moins une fois dans l'année, qu'il ait bénéficié ou non d'une prise tensionnelle

1. Parmi les patients diabétiques de type II vous ayant choisi comme médecin traitant :



- 1.1. patients présentant un taux d'hémoglobine glyquée (HbA1c) inférieur à 7.5%
- 1.2. patients présentant un taux d'hémoglobine glyquée inférieur à 8.5%
- 1.3. patients présentant un LDL cholestérol inférieur à 1.3 g/l
- 1.4. patients présentant un LDL cholestérol inférieur à 1.5 g/l

Exemple 1 : Un de vos patients présente un diabète de type II, a un taux d'hémoglobine glyquée de 6.9%, un LDL cholestérol de 2.1 g/l et ne vous a pas déclaré comme médecin traitant. Il n'est donc compté dans aucune catégorie de l'ensemble 1. car vous n'êtes pas son médecin traitant.

Exemple 2 : Un patient présente un diabète de type II, a un taux d'hémoglobine glyquée de 8.2%, un LDL cholestérol de 1.9 g/l et vous a déclaré comme médecin traitant. Il est donc compté dans les catégories 1.2.

Exemple 3 : Un patient présente un diabète de type II, a un taux d'hémoglobine glyquée de 7.3%, un LDL cholestérol de 1.4 g/l et vous a déclaré comme médecin traitant. Il est donc compté dans les catégories 1.1. et 1.4.

2. Parmi les patients hypertendus traités par antihypertenseurs vous ayant choisi comme médecin traitant :

2.1. patients présentant une PAS inférieure ou égale à 140 mmHg et une PAD inférieure ou égale à 90 mmHg

Nb patients hypertendus traités, avec MT et pression artérielle \leq 140/90 mmHg

Exemple 1 : Un de vos patients présente une hypertension, n'est pas traité par antihypertenseurs, présente une PAS de 138 mmHg et une PAD de 83 mmHg, et vous a déclaré comme médecin traitant. Il n'est donc pas compté dans la catégorie 2.1. car il n'est pas traité par antihypertenseur.

Hypertension
HT sans traitement

Exemple 2 : Un de vos patients présente une hypertension, est traité par antihypertenseurs, présente une PAS de 138 mmHg et une PAD de 91 mmHg, et vous a déclaré comme médecin traitant. Il n'est donc pas compté dans la catégorie 2.1. car il n'a pas une PAD inférieure ou égale à 90 mmHg.

Hypertension
HT avec traitement

Exemple 3 : Un de vos patients présente une hypertension, est traité par antihypertenseurs, présente une PAS de 129 mmHg et une PAD de 89 mmHg, et vous a déclaré comme médecin traitant. Il répond donc à tous les critères de l'indicateur 2.1.